




















Схема расположения листов J-38















ПО ГРР Армгеология	Отчет по составленным геологическим картам Азизбековского рудного района	
Геолого-географическая экп.	Отв. исполн. нач. партии Э.В. Харатьян	Год сдачи отчета 1989 г.
Приложен. 1 Лист 3	Геологическая карта Азизбековского рудного района J-38-7-Г(б,з)	
Масштаб 1:50000	Использована топооснова м-ба 1:50000, год изд. 1960	
Составил Чертила карт. Т.С. Ворданян		







ПО "Армгеология"
АРМЕОЛФОНД
12.09.89 г.
Инв. № 3254/000


Условные обозначения

-  Современный аллювиальный, пролювиальный отложения: валуны, галечники, гальки, гравий, щебень
-  Верхне-четвертичные современные андезит-базальты
-  Верхне-четвертичные балунно-глыбовые образования
-  Верхне-четвертичные андезиты
-  Верхне-четвертичные андезит-базальты
-  Средне-верхне-четвертичные андезит-базальты
-  Средне-четвертичные андезит-базальты
-  Средне-четвертичные андезит-базальты
-  3^й покров
-  2^й покров
-  1^й покров
-  Нижне-четверт. липарито-дацитовые пемзы, конгло-брекчии, пески с примесью обломков андезитов
-  Средне-четвертичные отложения
-  Миоцен. Липариты серые, липарито-дациты плотные розовые
-  Верхний миоцен-нижний плиоцен. Андезито-дацитовая толща. Андезито-дациты, дациты, андезиты
-  Верхний миоцен-нижний плиоцен. Вулканоогенно-обломочная толща. Брекчии, туоры, туоры кислого состава
-  Верхний олигоцен-нижний миоцен. Андезиты, эвгерловыя брекчии, брекч. туоры, местами в основании пестроцветные глины
-  Верхний эоцен-олигоцен. Кислая вулканоогенная толща: дациты, липарито-дациты, липариты, обсидианы
















-  Верхний эоцен. Плагиоклазовые пороксеновые андезиты, ивс туоробрекчии, туоры
-  Ср. эоцен. Толща известковых песчаников; известняки, песчаники, известковые конгломераты, туоропесчаники
-  Ср. эоцен. Толща туоропесчаников. Туоропесчаники, туороалевролиты
-  Ср. эоцен. Туоропесчаниковая толща. Туороалевролиты, туоропесч., туоролиты. Местами в основании андезит, дацитовые порфириты
-  Плиоцен-нижний эоцен. Известняки, известковые конгломераты
-  Верх. сснн. Кампан-моастроухт. Известковые песчаники, арауллиты, глины, песчаные известняки
-  Сантон. Пелитомоюрные глины известняки
-  Верхний коньяк. Пестроцветные конгломераты, песчаники, аравелиты
-  Туран-нижний коньяк. Базальты конгломераты, песчаники, глины, конгломераты, известковые песчаники
-  Ср. отдел. Байос-баш. Глины с бурыми песчаностями стяжениями, мергели
-  Нижний-средний отделы. Тонкообластые, плитчатые орудные, доломитизированные известняки
-  Нижний-ср. пермь. Темно-серые битуминозные известняки, мергели с проглиями песчаных битумин. Глины

Субвулканические обр-ния

-  Андезито-дациты
-  Пороксен, рогообманковые андезиты
-  Позднеэоценовые андезиты, андезит-дациты
-  Верхнеэоценовые дацитовые порфириты
-  Среднеэоценовые диоритовые порфириты, эаббро-порфириты
-  Средний плиоцен.

 Позднесреднеэоценовые дациты и даикообразные тела андезитов

Интрузивные породы

-  Олигоцен. Кварцевые дациты, липарито-дациты
-  Верхний эоцен. Диоритовые порфириты
-  Верхний олигоцен. Габбро, эаббро-диориты
-  Верхний эоцен-олигоцен. Гранодиориты и кварцевые диориты
-  Позднеэоценовые кв. сиситы, гранодиориты (хб); гранодиориты, диориты, манцаниты (хб); эаббро, эаббро-диориты (хб); олибиновые эаббро (επ); агортиты (α)
-  Туран-доверхнеконьякские кварцевые порфириты
-  Даик дацитовых порфиритов, верхнемиоцен-нижне-плиоценовые
-  Даик эаббро-порфиритов и диорит-порфиритов
-  Красноцветный горизонт туоролитов
-  Контактные розовки
-  Гидротермально-измененные, коллоидизированные, захороненные, порфитизированные породы
-  Формация вторичных кварцитов. Монокварциты
-  Разрывные нарушения: а) действительные; б) предполагаемые, в) разрывы без действительных смещений
-  Направление течения лав
-  Вулканические центры кратером

ПО "Армгеология"
ФОНД
№ 09
Инв. 5264 об. 1989 г.

П/О ГРР	Отчет по составлению геологической карты Азизского района рудного района	
Армгеология	Геолого-географическая экспед.	Год сдачи отчета 1989 г.
Лист 7	Условные обозначения геологической карты Азизского района	Исполн. Л.С. Каросян
Масштаб 1:50000	Использована топооснова м-ба 1:50000, год изд. 1960	Черт. Т.С. Варданян